

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин во всем мире, а вызывает заболевание вирус папилломы человека или ВПЧ.

ВПЧ-инфекция, является достаточно распространенной. Практически все люди, ведущие активную половую жизнь, в тот или иной момент жизни инфицируются вирусом во время полового контакта.

Вирус проникает в клетки через микродефекты кожи и слизистых оболочек и в дальнейшем вызывает изменения, которые с течением времени приводят к новообразованиям, в том числе раку шейки матки. Период между инфицированием и заболеванием составляет, как правило, от 10 и более лет.

Республика Беларусь одна из 48 стран Европейского региона ВОЗ, включивших в календарь профилактических прививок вакцинацию от ВПЧ.

В нашей стране с 1 января 2025 года вакцинация против ВПЧ-инфекция, включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится девочкам в возрасте 11 лет.

Почему вакцинируют в 11 лет?

- **Оптимальный**  
иммунный ответ: Иммунная система детей этого возраста демонстрирует высокую эффективность в выработке защитных антител.

- **До начала половой**  
жизни: ВПЧ передается половым путем, поэтому важно сформировать иммунитет до потенциальной встречи с вирусом.

- **Долгосрочная**  
защита: Вакцинация, проведенная в этом возрасте, обеспечивает стойкую и длительную защиту.

Справочно: Вакцины против ВПЧ применяются уже на протяжении 18 лет.

В Англии (Соединенное Королевство) программа иммунизации против ВПЧ привела к практически полной ликвидации рака шейки матки среди женщин, рожденных после 1 сентября 1995 г. и прошедших вакцинацию в возрасте 12–13 лет. Кроме того, у этих женщин существенно снизилась распространенность поражений шейки матки поздней (третьей) стадии, способных позже развиться в рак.

Полученные в Англии результаты еще раз доказывают, что рак шейки матки относится к предотвратимым заболеваниям. Своевременная вакцинация детей до первого контакта с вирусом – ключевое условие, позволяющее пресечь распространение в будущем.

О вакцине «Цеколин»

В нашей стране для иммунизации против ВПЧ девочек 11 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок используется вакцина «Цеколин» — современный и безопасный препарат.

Вакцина направлена против двух самых онкогенных типов ВПЧ (16 и 18), которые вызывают до 70% всех случаев рака шейки матки.

Как проходит вакцинация?

Курс вакцинации состоит из двух инъекций:

- Первая доза — в выбранную дату после консультации с педиатром.
- Вторая доза — через 6 месяцев после первой.

Как записать ребенка на вакцинацию?

Получить консультацию педиатра и записать ребенка на последующую вакцинацию можно в территориальной поликлинике по месту жительства.