

Согласовано
Зам. главного врача
Бусел А.П.

Клещевой энцефалит – природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, в результате которого повреждаются различные отделы нервной системы.

Переносят вирус иксодовые клещи, которые заражаются при укусе ежей, зайцев, белок, а также некоторых птиц (щеглы, дрозды). Также вирус передается от самок клещей к их потомству, что позволяет сохранять непрерывную циркуляцию клещевого энцефалита среди клещей.

Вирус может передаваться человеку при укусе клеща, при его раздавливании и втирании в кожу, при употреблении зараженного сырого козьего молока и молочных продуктов (сметаны, сыров и др.), а также от инфицированной клещевым энцефалитом матери к ребенку во время беременности.

С момента заражения до появления первых клинических симптомов (инкубационный период) может пройти от 4 до 30 дней.

Клещевой энцефалит может протекать как в острой, так и в хронической форме, при этом осложнения, ведущие к инвалидности, могут возникать как при острой, так и при хронической формах клещевого энцефалита.

Симптомами заболевания являются - общая слабость, головная боль без четкой локализации, рвота, повышение температуры, нарушение сознания и сна, неспособность сгибать шею и колени, судороги.

Клещевой энцефалит распространен в Сибири, Урале, Европе, Европейской части России. Ежегодно случаи клещевого энцефалита регистрируются среди населения города Могилева и Могилевского района.

Основными мерами профилактики клещевого энцефалита являются соблюдение мер безопасности при выходе в лес, употребление в пищу термически обработанного козьего молока и молочных продуктов (кипячение 1-2 минуты), вакцинация (лицам, выезжающим в эндемичные районы и подлежащим профилактическим прививкам).

Необходимо помнить, что при выходе в лесные массивы требуется надеть белую одежду так, чтобы не было видно открытых участков кожи, распылить акарицидно-репеллентные средства на одежду для отпугивания клещей и насекомых, и проводить постоянный взаимоосмотр на предмет наличия клеща.

При укусе клеща, а также появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства.

Врач-интерн

Захарова А.Ю.