

Памятка по предотвращению появления вшей и их распространения в семье

Проведение профилактических (гигиенических) мероприятий:

- ✓ регулярное (не реже 1 раза в 7-10 дней) мытье тела;
- ✓ одновременная с мытьем тела смена постельного, нательного белья или смена белья по мере загрязнения с последующей стиркой;
- ✓ регулярная стрижка и ежедневное расчесывание волос головы;
- ✓ систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей;
- ✓ регулярное проведение уборки помещений, содержание в чистоте предметов обстановки;
- ✓ при проведении взаимного осмотра членов семьи на педикулез, необходимо особое внимание обращать:

- при осмотре головы – на височно-затылочные области;

- при осмотре одежды и белья – на швы, складки, воротники, пояса.

При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо-гнида, личинка, взрослое насекомое) дезинсекционные мероприятия проводят одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле человека, так и его белье, одежде и прочих вещах и предметах.

При незначительном поражении головными вшами (от 1 до 10 экземпляров, включая яйца) целесообразно вычесывать насекомых и яйца частым гребнем, стрижка или сбривание волос.

Для этих целей:

- перед вычесыванием гнид с волос голову моют, ополаскивают теплым 4-5% водным раствором столового уксуса или теплым 5-10% раствором уксусной кислоты;
- на плечи подкладывают пеленку или бумагу;
- сквозь зубцы частого гребня пропускают ватный жгут или нитку, которые обильно смачивают уксусом, и счесывают гниды;
- пеленку или бумагу вместе с собранными волосами и насекомыми сжигают.

При средней и большой пораженности (от 10 экземпляров и более, включая насекомых и яйца) рекомендуется использовать инсектициды педикулициды.

ВНИМАНИЕ! Запрещается обработка педикулицидами: детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин, людей с заболеваниями и повреждениями волосистых частей тела и головы (микротравмы, дерматиты, экземы и т.д.) с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам.

При обнаружении вшей на теле человека проводят мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой; при необходимости сбривают волосы; одновременно сменяют белье.

При незначительном поражении платяным педикулезом проводят кипячение белья в 2% растворе кальцинированной соды в течение 15 минут, проглаживают горячим утюгом швы, складки, пояса белья и одежды, не подлежащих кипячению, или используют педикулицид согласно инструкции производителя.

После проведения заключительной очаговой дезинсекции в очаге платяного педикулеза специалистами центра гигиены и эпидемиологии средством «Авицин»:

- ✓ помещение проветрить до исчезновения запаха средства;
- ✓ через сутки после проведения дезинсекции в резиновых перчатках провести влажную уборку поверхностей, с которыми контактирует человек с использованием мыльно-содового раствора (30-50г кальцинированной соды на 1л воды).

Памятка по предотвращению появления вшей и их распространения в семье

Проведение профилактических (гигиенических) мероприятий:

- ✓ регулярное (не реже 1 раза в 7-10 дней) мытье тела;
- ✓ одновременная с мытьем тела смена постельного, нательного белья или смена белья по мере загрязнения с последующей стиркой;
- ✓ регулярная стрижка и ежедневное расчесывание волос головы;
- ✓ систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей;
- ✓ регулярное проведение уборки помещений, содержание в чистоте предметов обстановки;
- ✓ при проведении взаимного осмотра членов семьи на педикулез, необходимо особое внимание обращать:

- при осмотре головы – на височно-затылочные области;
- при осмотре одежды и белья – на швы, складки, воротники, пояса.

При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо-гнида, личинка, взрослое насекомое) дезинсекционные мероприятия проводят одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле человека, так и его белье, одежде и прочих вещах и предметах.

При незначительном поражении головными вшами (от 1 до 10 экземпляров, включая яйца) целесообразно вычесывать насекомых и яйца частым гребнем, стрижка или сбривание волос.

Для этих целей:

- перед вычесыванием гнид с волос голову моют, ополаскивают теплым 4-5% водным раствором столового уксуса или теплым 5-10% раствором уксусной кислоты;
- на плечи подкладывают пеленку или бумагу;
- сквозь зубцы частого гребня пропускают ватный жгут или нитку, которые обильно смачивают уксусом, и счесывают гниды;
- пеленку или бумагу вместе с собранными волосами и насекомыми сжигают.

При средней и большой пораженности (от 10 экземпляров и более, включая насекомых и яйца) рекомендуется использовать инсектициды педикулициды.

ВНИМАНИЕ! Запрещается обработка педикулицидами: детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин, людей с заболеваниями и повреждениями волосистых частей тела и головы (микротравмы, дерматиты, экземы и т.д.) с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам.

При обнаружении вшей на теле человека проводят мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой; при необходимости сбривают волосы; одновременно сменяют белье.

При незначительном поражении платяным педикулезом проводят кипячение белья в 2% растворе кальцинированной соды в течение 15 минут, проглаживают горячим утюгом швы, складки, пояса белья и одежды, не подлежащих кипячению, или используют педикулицид согласно инструкции производителя.

После проведения заключительной очаговой дезинсекции в очаге платяного педикулеза специалистами центра гигиены и эпидемиологии средством «Авицин»:

- ✓ помещение проветрить до исчезновения запаха средства;
- ✓ через сутки после проведения дезинсекции в резиновых перчатках провести влажную уборку поверхностей, с которыми контактирует человек с использованием мыльно-содового раствора (30-50г кальцинированной соды на 1л воды).