

## Первый укус клеща

С наступлением весны и теплых дней, проснулись после зимней спячки клещи.

19 марта 2023 года зарегистрировано первое обращение в учреждение здравоохранения по поводу укуса клеща. Пострадавший – ребенок до 17 лет. С дальнейшим потеплением возрастет активность клещей, в том числе и нападение на население.

При сохранении высокого уровня укусов клещами населения (2469 человек) в 2022 году, зарегистрирован рост заболеваемости Лайм-боррелиозом в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом. При проведении эпидрасследования было установлено, что в 99% пострадавшие не принимали профилактическое лечение.

Зараженность клещей Лайм-боррелиозом в 2022 году также выросла в 4 раза по сравнению с 2021 годом (2022 - 9,7%, 2021 – 2,6%).

В целях профилактики клещевых инфекций для индивидуальной защиты населения от нападения иксодовых клещей необходимо:

- отправляясь в лес, одеть светлую одежду с длинными рукавами, заправить брюки в носки.;
- одежду обработать акарицидными репеллентами (Kontra, OZZ и др.) согласно прилагаемой инструкции к препарату;
- после посещения леса тщательно осмотреть кожные покровы на наличие клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща, его нужно удалить и принять профилактическое лечение. Удалить клеща можно в хирургическом кабинете территориального ЛПО, в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время - взрослому населению – в травматологическом пункте по адресу: г. Могилев, ул. Пионерская, 15, детям - в травмопункте УЗ «МОДБ» (г. Могилев, ул. Бирули 9).

Если Вы самостоятельно удалили клеща, не забудьте принять профилактическое лечение в первые 72 часа после укуса клеща.

Энтомолог УЗ «МЗЦГЭ»

Матвеевко Н.Г.