

Информация для размещения на сайте

«Профилактика бешенства»

Эпизоотологическая обстановка по бешенству (рабической инфекции, гидрофобии) среди животных на территории г.Могилева и Могилевского района по-прежнему остается напряженной. Ежегодно регистрируются случаи заболеваний как среди диких плотоядных животных (лиса, енотовидная собака, олень), так и среди домашних и безнадзорных животных.

Важно помнить, что бешенство – абсолютно смертельное заболевание. Появление клинических признаков указывает на то, что заболевание вошло в острую фазу и излечение невозможно: человек погибает от паралича дыхательной системы или остановки сердца. Среди жителей г.Могилева и Могилевского района случаи гидрофобии не регистрировались.

Для предупреждения заражения бешенством следует:

- соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) в том числе, в обязательном порядке, **ежегодно** осуществлять профилактическую иммунизацию против бешенства;
- избегать любого рода контакта с дикими и безнадзорными животными, не приносите домой диких животных (как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком, если же такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством, поэтому следует принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких). Бездомных или больных животных приносите в свой дом только после посещения ветеринарного врача и проведения им профилактической прививки против бешенства.

Важно помнить, что для человека опасны не только укусы, но и царапины, нанесенные больным или подозрительным на бешенство животным, ослюнение поврежденных кожных покровов (даже незначительно поврежденных кожных покровов) и слизистых оболочек.

В случаях, когда контакта с животным, даже внешне здоровым, избежать не удалось, необходимо:

- провести первичную обработку места контакта – обильное промывание раны в течение нескольких минут (до 15 минут) водой с мылом;
- при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода (повидон-йодом или любым 70% спиртосодержащим антисептиком);
- наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в организацию здравоохранения. Только врач оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при надобности, курс профилактических прививок.

Вакцинация проводится бесплатно в организациях здравоохранения города (для взрослых «УЗ «Могилевская центральная поликлиника» по адресу: г.Могилев, ул. Пионерская, 15 (круглосуточно); для детей УЗ

«Могилевская областная детская больница» по адресу: г.Могилев, ул. Б.Бирули, 9 (круглосуточно)).

Единственным эффективным средством профилактики бешенства является своевременное оказание антирабической помощи. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенной вакцинации и самовольно прерывать ее. Это может привести к трагическим последствиям.

При этом очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного – его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения.

За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.

Но наблюдение за животными ни в коем случае не заменяет проведение антирабической вакцинации!

На государственном уровне принимаются меры по неукоснительному исполнению субъектами хозяйствования правил содержания животных, а также проведению мероприятий по профилактике бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных на предприятиях (хозяйствах), занятых их разведением и содержанием

Врач-эпидемиолог

Тишкова Л.О.