

Ситуация по укусам клещей и клещевым инфекциям в городе Могилеве и Могилевском районе остается напряженной. Так. На 30.09.2022 в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей уже обратилось 2168 человек, 29% из обратившихся (631 чел.) – дети. За аналогичный период 2021 года - 2363 человека, 31% (721) - дети.

Клещ сам по себе не опасен, а опасны возбудители.

При наступлении осенней поры, возрастает риск нападения клещей при посещении населения лесных массивов, при сборе грибов, ягод.

Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и кустарником. Клещи могут находиться на лесных дорожках и тропках, поросших по обочинам травой. Клещи не летают. Они не сидят на деревьях и не падают сверху на людей и животных. Клещи обитают на высокой траве и принимают позу ожидания, чтобы потом зацепиться за одежду человека или шерсть животных. Далее клещ добирается до кожи и присасывается.

Клещи являются переносчиками многих заболеваний (Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит и др.). Наиболее чаще регистрируется заболевание Лайм-боррелиоз. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 180 случаев, из них дети до 17 лет – 7% (12 человек).

Справочно: за весь 2021 года среди населения было зарегистрировано 113 случаев заболевания Лайм-боррелиозом,

Заболевания клещевыми инфекциями легче предупредить, чем лечить.

В целях профилактики клещевых инфекций для индивидуальной защиты населения от нападения иксодовых клещей необходимо:

- отправляясь на отдых в лес, в природные условия одеть светлую одежду с длинными рукавами, заправить брюки в носки.;
 - одежду обработать акарицидными репеллентами (Kontra, OZZ и др.) согласно прилагаемой инструкции к препарату;
 - собак, кошек после посещения лесной зоны осмотреть на наличие присосавшихся клещей, при обнаружении клеща - провести его удаление с соблюдением правил личной безопасности (использование перчаток);
 - после посещения леса тщательно осмотреть кожные покровы на наличие клещей.
- При обнаружении присосавшегося клеща, нельзя его раздавливать, необходимо удалить и принять профилактическое лечение. В городе Могилеве эту помощь могут оказать в хирургическом кабинете территориального ЛПО, в выходные дни, вечернее и ночное время – в травматологическом пункте (г.Могилев, ул. Пионерская, 15) - у взрослых, детей в травмопункте – УЗ «МОДБ» (Могилев, Бирули 9).

Необходимо помнить, что клещевыми инфекциями (**клещевым энцефалитом**) можно заболеть и при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому употреблять продукты (молоко, сметана и др.) рекомендуется только после кипячения. Чтобы вирус погиб, достаточно кипячение в течение 2–3 минут

Очень важно для пострадавших от клеща! Если Вы самостоятельно удалили клеща, не забудьте принять профилактическое лечение в первые 72 часа после укуса.