

Памятка по профилактике коклюша в стационаре

Источник инфекции	Возбудитель инфекции	Путь передачи. Инкубационный период	Восприимчивость
<ul style="list-style-type: none"> ● Больной человек; ● Больной стертыми формами без характерных приступов кашля; ● Взрослые, привитые с атипичным течением. 	<p>3 вида бактерий рода <i>Bordetella</i> (грамотрицательны, имеют 3 серотипа, меняющихся в ходе болезни):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bord.pertussis</i> - <i>Bord.paraper-tussis</i> - <i>Bord.bronchi-septicus</i> <p>В очагах циркулируют одновременно 2 и даже 3 серотипа.</p>	<p>Воздушно-капельный при прямом контакте. 2-14 дней</p>	<p>Всеобщая и регулируется перенесенной болезнью или вакцинопрофилактикой. Особенно восприимчивы дети грудного возраста, потом – младшего.</p>
<p>Основание: Д.В.Полешко, «Справочник инфекциониста», г. Минск, изд. «Беларусь», 1987г.</p>			

Классификация случаев заболеваний коклюшем		
<i>Клинический</i>	<i>Лабораторно подтвержденный</i>	<i>Эпидемиологически подтвержденный</i>
<p>Случай, характеризующийся кашлем продолжительностью не менее 2 недель при наличии 1 или нескольких симптомов: – приступообразный кашель; – свистящий вдох после ряда кашлевых толчков; – посткашлевая рвота без другой видимой причины</p>	<p>Случай, соответствующий определению клинического случая, и подтвержденный лабораторно</p>	<p>Случай, не подтвержденный лабораторно, но соответствует определению клинического случая и эпидемиологически связанный с лабораторно подтвержденным случаем коклюша</p>
<p>Основание: Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения коклюша», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 70 от 13.06.2012г.</p>		

Санитарно-противоэпидемические мероприятия (эпидобследование очага в течение 24 часов с момента получения экстренного извещения проводят врач-эпидемиолог либо помощник врача-эпидемиолога ЦГЭ)		Основание
Меры профилактики		
В отношении очага инф.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор сведений о предполагаемом месте и сроке заражения, источнике инфицирования. 2. Определить границы очага. 3. Выявление, составление списков контактных лиц. 4. Заключительная дезинфекция не проводится, проводится проветривание, влажная уборка не реже 2-х раз в день. 5. В очаг инфекции в течение 14 календарных дней после изоляции больного запрещен прием не перенесших заболевание детей либо с незаконченным курсом вакцинации. 6. Проведение информационно-просветительской работы. 	Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения коклюша», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 70 от 13.06.2012г.
В отношении заболевшего	<ol style="list-style-type: none"> 1. В первые 3 дня с даты установления диагноза лабораторное обследование для бактериологических исследований, ПЦР и серологических исследований. Для серологических исследований повторный забор сыворотки крови через 3-4 недели. 2. Изоляция и госпитализация в инфекционную больницу по эпидемиологическим показаниям: <ul style="list-style-type: none"> - очаг с круглосуточным пребыванием детей; - наличие в семье не иммунизированных детей или с незаконченным курсом вакцинации; и клиническим показаниям. 	
В отношении контактных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изоляция в границах очага. 2. Контактные, работающие в детских больницах, при наличии кашля подлежат отстранению от работы. 3. Меднаблюдение в течение 14 календарных дней (термометрия, опрос, описание общего состояния здоровья). 4. Лабораторное обследование однократно бактериологическим методом и методом ПЦР кашляющих более 7 дней: <ul style="list-style-type: none"> - детей в детских больничных ОЗ; - работающих в роддомах, детских больничных ОЗ 	

Памятка разработана специалистами отделения надзора за ОЗ и профилактики ВБИ УЗ «МЗЦГЭ» в соответствии с требованиями:

- Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения коклюша», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 70 от 13.06.2012г.

- Д.В.Полешко, «Справочник инфекциониста», Минск, «Беларусь», 1987г.