

В структуре смертности болезни системы кровообращения составляют 50,4%, новообразования -16,96%, травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин – 8,5%, старость 8,1% (рис. 8).



Рис. 8. Структура смертности населения г. Могилева в 2013г.

Среди трудоспособного населения увеличилась смертность от новообразований на 5,4%, болезней системы кровообращения на 6,8%, органов пищеварения на 16,3%, мочеполовой системы на 15%. Снизилась смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний на 22,6%, болезней органов дыхания на 22,1%, несчастных случаев на 3,5%. Смертность от БСК в трудоспособном возрасте составляет 30,9% от общего числа смертей.

В 2013г. среди всего населения отмечается снижение смертности от травм, несчастных случаев, отравлений и воздействий внешних причин (рис. 9).




Рис. 9. Динамика показателей смертности населения г.Могилева от внешних причин в 2003-2013гг.

Анализ суицидального поведения показывает, что склонность к совершению самоубийств в определенной мере зависит от социального статуса людей. Чаще суициды совершаются мужчинами. Факторами, провоцирующими самоубийство, являются: неблагополучие в семье, социальная неустроенность, одиночество, низкий уровень материального обеспечения, злоупотребление спиртными напитками (свыше 30% суицидов совершено в состоянии алкогольного опьянения), душевные расстройства.

Структура данного класса не претерпела серьезных изменений: наблюдается тенденция к снижению смертности от случайных отравлений алкоголем на 12,9%, убийств на 53,8%, случаев связанных с транспортными средствами на 13,5%. Выросла смертность от самоубийств на 22,5%.

В последние 3 года уровень случайных отравлений алкоголем и его суррогатами колеблется, но сам показатель регистрируется на «высоком уровне» (рис. 10).




Рис. 10. Динамика смертности взрослого населения от случайных отравлений алкоголем в 1993-2013гг. по г. Могилеву

Следует подчеркнуть, что в г.Могилеве от случайных отравлений и воздействия ядовитых веществ умирает в 1,5-2 раза больше людей, чем гибнет в ДТП. Несмотря на широкую антиалкогольную пропаганду по формированию здорового образа жизни в рамках реализации государственной программы демографической безопасности, не удастся значительно сократить количество случайных отравлений алкоголем, спиртосодержащими жидкостями в связи с безразличным отношением к своему здоровью части населения, проблемами социальной адаптации части общества.

Резюме. В целом, в 2013г. сохранилась тенденция к росту рождаемости населения и с 2012 года данный показатель превышает показатель смертности. По критериям оценки показателей естественного движения населения, такой уровень показателей рождаемости, смертности, младенческой смертности характеризует продолжение движения демографических показателей от низкого уровня в сторону улучшения – к среднему (пока степень ниже средних, но выше низких).

Однако, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов, рост показателей смертности, спад рождаемости в 90-е годы прошлого столетия, обуславливают демографическое старение могилевчан.

Таким образом, проблемным вопросом остается необходимость роста естественного воспроизводства населения города и социально-экономические методы его стимулирования.