

Раздел I. Состояние и риски популяционному здоровью на территории г. Могилева (ч. 2)

Отмечается рост смертности жителей г. Могилева от новообразований на 3,5% и болезней мочеполовой системы на 6,8%. По остальным классам болезней наблюдается снижение смертности: от инфекционных и паразитарных болезней на 32%, органов дыхания на 8,6%, болезней системы кровообращения на 11,5%, органов пищеварения на 7,9%, несчастных случаев на 40,1%. (рис. 6, 7).



Рисунок 6 – Показатели смертности населения г. Могилева от злокачественных новообразований, травм и сердечно-сосудистых заболеваний в 2004-2017гг.




Рисунок 7 – Показатели смертности населения г. Могилева от болезней органов пищеварения, органов дыхания, инфекционных заболеваний, мочеполовой системы в 2002-2017гг.

В структуре общей смертности на первом месте по-прежнему болезни системы кровообращения (далее – БСК) – 53,1% (рис.8).

Число умерших от БСК снизилось на 11,5%. В трудоспособном возрасте смертность снизилась на 28,5%.

На втором месте смертность от новообразований – 17,%. Количество умерших от новообразований увеличилось на 3,5% (в трудоспособном возрасте на 1,2%).

На третьем месте – несчастные случаи, которые составляют 4,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев снизилось на 40,1% (в трудоспособном возрасте на 38,15%).

В структуре несчастных случаев по городу наибольший процент (27,7%) приходится на самоубийства – 46 случаев. Количество суицидов снизилось на 27% (в трудоспособном возрасте на 33,3%).

На втором месте случайные отравления алкоголем, на которые приходится 22 случая (13,2%). Количество отравлений алкоголем выросло на 5,26% (в трудоспособном возрасте снизилась на 48,1%).

На третьем месте *случаи, связанные с транспортными средствами* - 20 случаев, что составляет 12%. Отмечается снижение смертности по этой причине на 9,1% (в трудоспособном возрасте осталась на уровне прошлого года).

Случайные утопления составляют 4,8% от всех несчастных случаев.

Убийства – 2,4% .

Смертность по причине старости в городе составляет 1,9%. Показатель снизился на 10,7%.




Рисунок 8 – Структура смертности населения г. Могилева в 2017г.




Рисунок 9 – Динамика показателей смертности населения г. Могилева от несчастных случаев в 2003-2017гг.

Анализ суицидального поведения показывает, что склонность к совершению самоубийств в определенной мере зависит от социального статуса людей. Факторами, провоцирующими самоубийство, являются: неблагополучие в семье, социальная неустроенность, одиночество, низкий уровень материального обеспечения, злоупотребление спиртными напитками (свыше 30% суицидов совершено в состоянии алкогольного опьянения), душевные расстройства.

В последние 3 года уровень случайных отравлений алкоголем и его суррогатами стабилизировался на более низком, чем в предыдущие несколько лет уровне, но сам показатель остается на «высоком уровне», а в структуре смертности от несчастных случаев занимает второе место (рис. 10).




Рисунок 10 – Динамика смертности взрослого населения от случайных отравлений алкоголем в 1993-2017гг. по г. Могилеву

Следует подчеркнуть, что в г. Могилеве от случайных отравлений и воздействия ядовитых веществ умирает в 1,5-2 раза больше людей, чем гибнет в ДТП. Несмотря на широкую антиалкогольную пропаганду по формированию здорового образа жизни в рамках реализации государственной программы демографической безопасности, не удастся значительно сократить количество случайных отравлений алкоголем, спиртосодержащими жидкостями в связи с безразличным отношением к своему здоровью части населения, значительными проблемами социальной адаптации части общества.