

## 1.2. Заболеваемость населения Могилевского района

В 2010г. показатели первичной заболеваемости взрослого населения Могилевского района регистрируются выше среднего уровня по Могилевской области (рис.6).




Рис. 6. Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Могилевского района за 2005-2010гг.

Первичная заболеваемость взрослого населения в сравнении с 2009г. снизилась на 15,2%, Удалось добиться снижения заболеваемости болезнями кровообращения на 17,3%, инфекционными заболеваниями на 40,3%, болезнями органов дыхания на 19,5%, эндокринной системы на 21,2%, психическими расстройствами на 63,5%, болезнями нервной системы на 54,6%, мочеполовой системы на 47,3%, болезнями костно-мышечной системы на 1,8%, травм и отравлений на 4,6%.

Отмечается рост первичной заболеваемости новообразованиями на 15,3% (в том числе злокачественными на 13,9%), болезнями крови в 2,1 раза, органов пищеварения на 1,4%, болезнями кожи на 13,6%

Показатель общей накопленной заболеваемости взрослого населения снизился на 3,9% и с 2001 года имеется тенденция к росту (рис. 7).




Рис.7. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Могилевского района в 2001-2010гг.

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения 43,4% занимают болезни органов дыхания, что связано с ежегодно регистрируемой вспышкой гриппа. На втором месте – травмы и отравления (13,1%), на 3-м месте – болезни костно-мышечной системы 11,3%. Болезни системы кровообращения составляют 8,2% в структуре первичной заболеваемости, 30,2% в структуре накопленной, хронической заболеваемости (рис. 8).




Рис. 8. Структура первичной заболеваемости взрослых Могилевского района в 2010г.

Анализ структуры общей накопленной заболеваемости взрослого населения показывает, что по-прежнему на первом ранговом месте остается заболеваемость системы кровообращения 30,2%, на втором органов дыхания – 21,4%, на третьем костно-мышечной системы – 13,1%. Также в структуре общей заболеваемости отмечается достаточно большое число случаев новообразований, травм и отравлений, высокая заболеваемость органов пищеварения, эндокринной, мочеполовой систем (рис. 9).




Рис.9. Структура общей заболеваемости взрослых Могилевского района в 2010г.

Резюме: В 2010г. показатели заболеваемости взрослого населения Могилевского района имеют тенденцию к снижению.

- С целью снижения заболеваемости и смертности проводятся следующие мероприятия:
- осуществляется постоянный мониторинг показателей;
  - определяются организационные мероприятия по их улучшению;

- проводится активная информационно – образовательная работа с населением: популяризация ЗОЖ, профилактика факторов риска БСК и онкозаболеваний, формирование мотиваций для отказа от употребления никотина, алкоголя, психоактивных веществ и др.;
- внедряются современные методы диагностики: ЭХО-КС, холтеровское мониторирование, УЗИ с доплерометрией и полостными датчиками, компьютерная томография, ИФА – диагностика, спирометрия с проведением проб и др.;
- используются малоинвазивные технологии (интерлокинг, артроскопия и др.),
- внедряются современные подходы к лекарственной терапии;
- широко используются современные физиотерапевтические методики: лазеротерапия, небулайзерная терапия, бальнеолечение и др.